CALLICORE CANDRENA CHRISTOPHERI ab. nov.

(Lep. Nymph.)

por

IAN GIBSON

Se separa *Callicore candrena* Godt. de las demás especies de este género, por la ausencia de una faja azulada en la faz superior de las alas anteriores.

Parece ser, sin embargo, una especie muy variable, variaciones éstas que se producen con preferencia en la faz inferior del ala posterior.

Citaremos algunas de las formas conocidas:

C. *callicore* ab. *köhleri* Giac. (Rev. Chil .de Hist. Nat. XX, p. 71).

C. *callicore* ab. *maldonadoi* Breyer (Rev. Soc. Ent. Arg. I. (5) p. 1).

C. *callicore* ab. *splendens* Hayward (Rev. Soc. Ent. Arg. IV. p. 120).



C. *callicore* ab. *breyeri* Hayward (Rev. Soc. Cientif. Arg. CXXIX, p. 43), y mencionaremos también el ejemplar anormal descripto por Breyer (Rev. Soc. Ent. Arg. II, p. 181) sin haberle dado nombre.

El ejemplar que hoy describimos como *Callicore candrena christopheri* tiene igualmente su particularidad, únicamente en la faz inferior de las alas posteriores, como se puede observar en la figura que acompañamos, todo el disco de estas alas, es decir, el círculo donde se encuentra comúnmente el dibujo de los "88", es negro y no blanco grisáceo, con excepción del interior de los "88" mismos, que es blanco grisáceo, y hay, además, dos manchitas más de ese mismo color.

Hemos capturado este ejemplar el 9 de enero de 1942 en Misiones (Rep. Argentina) a unos 7 km tierra adentro de las costas del río Uruguay, a orillas del río Alférez Chico, que desemboca en el Uruguay, entre las Colonias Panabí y Rosario.

Dedicamos este ejemplar a nuestro padre.

Holotipo macho en nuestra colección.

Diciembre de 1944.